

ID :
氏名 : 様

自費診療に係る説明文書及び同意書

(1) 自費診療の内容および初診・再診の取り扱い
保険ではなく、自費での診療対象となるものに関しては、同意・署名を頂いたうえで診療・処方を行います。
勃起不全症(以下、ED)の診療・薬剤の処方、自費診療の対象となります。

該当する自費診療を初めて行った日を初診として扱い、初診料を算定します。
受診日から起算して3ヶ月以内に同様の自費診療を行った場合には、再診料を算定します。
なお、受診日から起算して3ヶ月以上経過した場合には、改めて初診料を算定します。

(2) 初診料・再診料・処方箋交付料
通常の保険診療にかかる金額の20割を徴収します。
初診料: 6,336円(税込) (再診料: 1,628円(税込))
処方箋料: 1,496円(税込)
* 上記は当院での診療にかかる費用です。薬代については、薬局で別にお支払い頂きます。
(各製剤の先発品のおおよその価格は、(4)の表をご参照ください)

(3) 治療薬の効果について
EDの治療のための薬として、バイアグラ® (シルデナフィル)・シアリス® (タダラフィル)・レビトラ® (バルデナフィル)のいずれかを用います。これらの薬により、性行為の1時間前に服用することで、満足な性行為を行うのに十分な勃起とその維持を期待することができます。
日本国内での臨床試験では、約7割の人に性交の成功が認められています(シルデナフィルの場合)。

(4) 各治療薬の特徴
下の表に、各薬剤の特徴を示します。

製剤比較	シルデナフィル (バイアグラ)	バルデナフィル (レビトラ)	タダラフィル (シアリス)
先発品の値段 (1錠)	25mg 約1,000円 50mg 約1,500円	10mg 約1,500円 (※先発品は販売中止)	約1,500円
特徴	世界初の治療薬で データ蓄積が豊富	シルデナフィルと 作用効果ともに、ほぼ同等	長時間作用
後発品	○	○	○
タイミング	性行為の1時間前 (タダラフィルは3時間前ほどでも可)		
間隔	24時間以上		
作用時間	約4時間		36時間
食事	空腹時に服用。高脂肪食、アルコールで吸収遅延あり (バルデナフィルの方が、食事の影響を受けにくい)		食事関係なし

(5) 処方を受ける前に必ず担当の医師、看護師又は薬剤師に伝えること
以下の患者さんには、治療薬を処方することができない可能性があります。
必ず担当の医師、看護師または薬剤師にお知らせください。

☐ 薬剤にアレルギーのある方

☐ 硝酸剤や一酸化窒素供与剤(ニトログリセリン、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)、
アミオダロン、抗不整脈薬、リオシグアトを内服している方

☐ 重篤な病気のある方(脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヵ月以内にある方、
網膜色素変性症、重度の肝障害、腎機能障害)

☐ 治療されていない高血圧がある方、あるいは低血圧の方

☐ 抗真菌薬を内服している方

(6) 予想される副作用

頭痛、紅潮、ほてり、消化不良などの症状があらわれることがあります。
症状が出現して支障がある場合には、ED 治療薬の服用を中止してください。
また、症状が続く場合には医療機関を受診してください。

(7) 同意及び情報提供に関する特記事項

治療薬は、説明を受けてその内容を理解・同意していただいた後に処方されます。
本剤による治療は、自由意思によって決めることができます。薬が残ってしまった場合でも、
絶対に他の人に譲らないでください。

治療を受けた際に、もし何らかの異常を感じた場合には担当の医師、看護師又は薬剤師に
お知らせください。

河北総合病院 泌尿器科